

**АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул.Коммунистическая, 33а,
г.Новосибирск, 630007
тел/факс 3734572

E-mail: kancnr@nso.ru

О.В.А.А.А. № *4163/01-6*
на _____ от _____

Главам муниципальных образований
Новосибирского района
Новосибирской области (по списку)

О направлении Постановления

Уважаемые коллеги!

В связи с письмом Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области направляем Вам постановление Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области «О мерах по предупреждению распространения энтеровирусной инфекции» от 05.06.2018 г. № 009 для принятия мер в соответствии с рекомендациями, изложенными в постановлении.


Приложение на 6 л. в 1 экз.

Глава района



А.А.Соболевский

С.Е. Галкина
373 46 73





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 15 » 06 2018 г.

№ 003

г. Новосибирск

О мерах по предупреждению распространения энтеровирусной инфекции

Я, Главный государственный санитарный врач по Новосибирской области А.Ф. Щербатов, проанализировав заболеваемость энтеровирусной инфекцией (ЭВИ), отмечаю, что в Новосибирской области ЭВИ в течение последних лет сохраняет свою актуальность. Увеличение активности эпидемического процесса заболеваемости ЭВИ продолжается с 2012 года.

Уровень заболеваемости в 2012 году составил – 1,49 на 100 тысяч населения, в 2013г. – 3,95, в 2014 году – 4,68, в 2015 году - 6,44, в 2016 году – 3,79, в 2017 году – 8,45, что в 2 раза выше показателя 2016 года и в 2 раза превышает среднероссийские показатели.

Эпидсезон заболеваемости ЭВИ приходится на летне-осенний период.

В 2017 году зарегистрировано 798 случаев подозрения на заболевание ЭВИ, что больше на 58,6 %, чем в предыдущем году (2016 году – 503 случая), из них в дальнейшем 200 случаев подтверждены лабораторно методом ПЦР (в 2016 г. – 100 случаев).

Среди заболевших ЭВИ 70 % составляют дети до 18 лет, из них – 60% посещающих детские образовательные учреждения (ДДУ, школы).

В структуре клинических форм ЭВИ преобладает энтеровирусный менингит - 84,5%, 5,1% - герпетическая ангина, 3 % - экзантема и 1,3 % ОРВИ энтеровирусной этиологии. ЭВИ не уточненной этиологии составила - 5,1%. Окончательный диагноз энтеровирусной инфекции подтвержден лабораторно в 100% случаях, в 235 случаях.

А.Ф. Щербатов